

ジェネシス治療とは

ロングパルスYAGレーザーを使用し、表皮上部に熱を加えることで、1：肌質の改善 2：毛穴開大の軽減 3：赤みの軽減 4：毛細血管拡張症治療 5：表面の引締め効果 ができるダウンタイムの少ない施術です。

＜施術前・施術中の注意＞

1. 洗顔後、病変部位にレーザーを照射します。メイクが残っていると照射に支障が出ますのでしっかり落としてください。
2. 産毛に反応しますのでご自身で剃毛をなさってご来院ください。
3. 施術中は暖かさを感じる程度ですが、熱さを感じましたら、すぐにスタッフにお申し出ください。
4. 施術中に赤みや痛みなどが強くでた場合には、途中で施術を中止する場合があります。
5. 複数回の施術を継続することにより、一層の肌質改善が期待できます。
6. 個人差はありますが、部位によっては際立って改善が見られないことがあります。
7. 治療後、肌は乾燥しやすい状態ですので、十分に保湿をしてください。
8. 治療部位は日焼け止めなどを使用し、必ず紫外線を避けてください。また、洗顔時などにマッサージやスクラブ洗顔などで顔をこすらず、泡で洗顔するように御注意ください。
9. 照射時にはあたたかさを感じます。熱すぎるようでしたらすぐお申し付けください。
10. 経過観察をする目的で施術部位の写真を撮らせていただきます。撮影後の写真に関しては、厳重に保管し患者様との経過観察以外で無断使用することはありません。
11. 唇に照射する際は、歯の変色のリスクがあります。施術中は口を開けないようにお気を付けください。
12. アートメイク部位は、火傷や変色のリスクがあるため照射を避けて施術します。治療前に必ず申告をお願いいたします。

＜施術後の注意点＞

1. レーザー治療後、シャワーはできますが、激しい運動・入浴・飲酒はお控えください。
2. 照射後、皮膚に赤み、膨疹、痒み、火傷、水ぶくれが生じることがあります。症状が出た場合は状況により軟膏を処方いたしますので医師の指示に従ってください。
3. 施術後は肌が敏感な状態になりますので、必ず日焼け止めなどのUV対策を行ってください。

＜下記の方は治療をお受けすることができません＞

- ・大きな黒子、瞼の上、傷のある部位
- ・妊娠中、重度の敏感肌、強い炎症（アトピーやかぶれなど）、脂漏性皮膚炎の部位、ヘルペス治療中、日光過敏症の方
- ・リウマチの方・金製剤を内服したことがある方

★トレチノイン使用されている方は前後2週間、レチノールを使用されている方は前後1週間、過酸化ベンゾイルを使用されている方は前後3日、使用をお控え下さい。

★授乳中の方は、術後48時間は断乳して頂きますようお願い致します。

★止血機能障害のある方、抗凝固剤内服中の方、ケロイド体質の方は医師の判断が必要になります。ヒアルロン酸、ボトックス等、その他美容治療（レーザー含む）の経験、外科的手術、医療機関での治療歴、治療予定のある方は必ずご申告ください。

自己申告のない方は当院での治療に伴う一切の責任を負いかねます。

以上は一般的な留意事項であり、症状等は個人差が生じる旨、ご理解いただけますようお願いいたします。