

二重全切開(上眼瞼除鄒)とは

二重全切開(上眼瞼除鄒)とは、まぶたの皮膚を切開して処置を行うことで、上まぶたをすっきりとさせながら希望のライン部分に強固な二重を形成する手術です。また、切開により上まぶたのたるみを除去することで、本来のすっきりした上まぶたを取り戻します。埋没法ではラインが取れやすい方、まぶたのたるみが気になる方には二重全切開(上眼瞼除鄒)法をおすすめします。

二重全切開(上眼瞼除鄒)後の状態・ケアについて

- ・当日は長時間の入浴はなるべく避け、軽いシャワー程度にしてください。術後1週間程度は血流が良くなることでの腫れを防ぐため、熱いお風呂を避けていただくことをおすすめします。
 - ・当日は手術部位に触れたり、濡らさないようご注意ください。術後24時間経過後はまぶた周辺も含め洗顔フォームを使用して洗顔可能です。
 - ・1週間後に来院していただき、抜糸を行います。
 - ・アイメイクは1週間後、抜糸をしてから可能です。ただし、最初のうちはまぶた周辺に触れる際はなるべく優しく、できる限り負担をかけないようにしてください。
 - ・強い腫れは、2週間程度で引いていきます。その後も時間の経過と共に腫れは引いていき、二重の場も狭まっています。完全に腫れが引き完成までには平均して半年ほどかかります。
 - ・内出血については、個人差がありますが数週間前後で消失します。
 - ・飲酒は血流が良くなり腫れが長引く原因になりますので、1週間ほどお控えください。
 - ・運動は血流が良くなり腫れが長引く原因になりますので、軽い運動は1週間、激しい運動は当面の間お控えください。
 - ・術後1週間後の抜糸完了まではコンタクトレンズの装着はお控えください。術後しばらくは目の周りに傷があるため、まぶたに違和感があったり、目がゴロゴロすると感じる場合があります。コンタクトレンズは、違和感がなくなってからの使用をおすすめいたします。
- ※経過観察をする目的で施術部位の写真を撮らせていただきます。撮影させていただいた写真に関しては、厳重に保管し患者様との経過観察以外で無断使用することはありませんので安心ください。
- ※左右差、腫れなど、気になる症状がある場合には1ヶ月程度様子を見てください。
- 1ヶ月以上経過しても違和感が継続している場合、クリニックまでご連絡ください。
- ※授乳中の方は、術後48時間は断乳して頂きますようお願い致します。

二重全切開(上眼瞼除鄒)で生じる可能性のあるリスクについて

【内出血】

目の周辺に内出血が生じる場合があります。最初は青黒い色みでその後黄色→肌色と変化していきます。出現や消失には個人差がありますが、数週間かかる場合があります。

【左右差】

手術直後より左右差が出ることがありますが、ほとんどの場合時間を置くことで差がなくなっていきます。ダウンタイム中は左右差を強く感じる場合があります。術後1ヶ月は様子を見ていただき、それ以上経っても左右差が気になるようでしたらご相談ください。

【痛み】

局所麻酔の注射時に痛みがあります。術中は麻酔の効果で痛みはありませんが、術後麻酔が切れると痛む場合があります。痛みがある場合は処方される内服薬をお飲みください。

【腫れ】

当日より若干の腫れが起こります。概ね1ヶ月で腫れは引いていきます。

【感染】

術後、感染が生じると傷口の治りが悪くなったり、腫れが強くなる場合があります。場合により、抗生剤の内服等の処置が必要となります。

【肥厚性瘢痕(ケロイド)】

ケロイド体質の方は傷が治る過程で皮膚が盛り上がってしまう場合があります。その場合、別途瘢痕に対する治療が必要になります。

【傷跡】

時間経過とともに目立たなくなりますが、まったくなくなることはありません。

【目のゴロツキ、充血、結膜炎】

瞼の裏がゴロゴロするような違和感や結膜の充血が続く事があります。目の違和感が続くようであればクリニックまでご相談ください。

【後戻り】

埋没法に比べると少ないですが、ごくまれに取れることがあります。

【ドライアイ】

手術後、目が乾きやすくなる場合があります。

【眼瞼痙攣】

手術後に痙攣するようになる場合があります。

【眼瞼下垂】

元々目を空ける力が弱い人は眼瞼下垂になる場合があります。

【予定外重瞼線】

予定した線ではないところにくぼみができる場合があります。

二重全切開(上眼瞼除鄒)をお受けいただけない方

妊娠中の方、親権者の同意がない未成年の方、まぶたに怪我や炎症がある方、局所麻酔剤にアレルギーをお持ちの方は手術を受けられません。