

THE ONE. KANPAN

□トランネキサム酸 500mg



朝・夕後 1日2回

シミ・肝斑の治療に広く用いられている治療薬です。メラニン発生の原因のひとつと考えられるプラスミンをブロックすることで、肝斑の原因となるメラニンの発生を抑制します。

※副作用 かゆみ、発疹、食欲不振、胸やけ、下痢などが報告されています。このような症状がありましたら内服を中止し、担当の医師に相談してください。

服用できない方

- ・血栓症（脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎、肺血栓）の方、またはそのおそれのある方
- ・ピルを服用している方
- ・妊娠中、または妊娠の可能性の高い方
- ・腎不全

□ハイチオール



毎食後 1回1錠

アミノ酸の1種でラニンの生成を抑える働きと、肌の新陳代謝を促進してメラニンを体外へ排出する働きがあります。

※副作用 吐き気、下痢、腹痛などが報告されています。

このような症状がありましたら内服を中止し、医師に相談してください。

□シナール配合錠



毎食後 1回1錠

ビタミンCのお薬です。シミの原因となるメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐとともに美しい肌に欠かせないコラーゲンの生成を促進します。

※副作用 胃不快感、吐き気、嘔吐、下痢などが報告されています。

このような症状がありましたら内服を中止し、担当の医師に相談してください。

□ビオチン0.2%



毎食後 1回1包

ビタミンB群、Hとも呼ばれ、皮膚や髪の毛、爪の健康維持に効果があります。また、皮膚のかゆみの原因となるヒスタミンの生成を抑える働きもあります。

□ユベラ50mg



毎食後 1回1錠

血管内での血液凝固を防ぎ、体内の血流を改善することで、皮膚の新陳代謝を促進し、色素沈着やシミ、そばかすを改善します。また、酸化によるダメージから細胞を守る働きがあります。

※副作用 便秘、胃部不快感、下痢、過敏症、発疹などが報告されています。

このような症状がありましたら内服を中止し、担当の医師に相談してください。