

脂肪注入とは

脂肪注入とは、ご自身から採取した脂肪をご希望の部位に注入する手術です。自分自身の脂肪を使用するため、異物反応もなく安心して治療できることが特長です。

脂肪注入によりボリュームアップ、シワの改善、窪みをふくらませる、お肌にハリを持たせるといった多様な効果が期待できます。凹凸感をなめらかにして窪みをふくらませることで、若々しい印象が手に入ります。

脂肪注入の持続性

注入された脂肪は時間とともに体内に吸収されますが、数割は注入部位に定着すると言われています。定着率は個人差があります。

脂肪注入にあたって

注入部位のデザインを確認の上、他の部位から脂肪を採取した脂肪をご希望の箇所に注入していきます。最終的な定着分を想定し多めに注入する場合があります。また注入後は局所麻酔剤など脂肪以外の液体も体内に入っている状態のため、とくに注入直後は腫れたように感じる可能性があります。時間経過とともに馴染んでいきます。

脂肪注入後の状態・ケアについて

- ・手術当日から翌日まで傷口を濡らさないように注意してください。それ以降は傷口周辺も含め洗っていただけますが、身体が温まりすぎないようにぬるま湯での軽いシャワー程度にしてください。1週間程度は血流が良くなることでの腫れを防ぐため、長時間の入浴や熱いお風呂を避けていただくことをおすすめします。

- ・1週間後に来院していただき、抜糸を行います。

- ・強い腫れは2週間程度で引いていき、その後も時間経過によって落ち着いていきます。

- ・注入された脂肪は、時間経過とともにある程度吸収され自然になじみます。注入部位に触れると硬い感じや違和感を持つ場合がありますが、徐々に落ち着いていきます。

- ・飲酒は1週間お控えください。

- ・軽い運動は1週間以上、激しいスポーツは2週間程度お控えください。ただし、採取部は動かすようにしてください。

※経過観察をする目的で施術部位の写真を撮らせていただきます。撮影させていただいた写真に関しては、厳重に保管し患者様との経過観察以外で無断使用することはありませんのでご安心ください。

※気になる症状がある場合には1ヶ月程度様子を見てください。1ヶ月以上経過しても違和感が継続している場合、クリニックまでご連絡ください。

※胸以外の注入で授乳中の方は、術後48時間は断乳して頂きますようお願い致します。

脂肪注入で生じる可能性のあるリスクについて

【内出血、皮下出血】

挿入部位周辺に内出血や皮下出血が生じる場合があります。最初は青黒い色みでその後黄色→肌色と変化していきます。出現や消失には個人差がありますが、数週間かかる場合があります。症状がひどい場合は穿刺や外科的処置が必要になることもあります。

【左右差】

手術直後より左右差が出る場合があります。ダウンタイム中はとくに左右差を強く感じる場合があります。元々人体は左右非対称であり、また個々の身体の形、筋肉の動き、普段の生活上の癖などが原因で、完全な左右対称にはならない場合があります。

【痛み】

術後、脂肪採取部位及び注入部位が痛む場合があります。痛みがある場合は処方される内服薬をお飲みください。

【感染】

注入後、熱を持ったり赤みが出て痛むようなときは、注入部位が炎症を起こしている可能性があります。感染が生じると傷口の治りが悪くなったり、腫れが強くなる場合があります。

場合により抗生剤の内服や外科的処置が必要となる可能性がありますので、違和感がある際はクリニックまでご相談ください。

【傷跡】

術後1～2ヶ月前後は赤みがあり硬く突っ張ったような感じがしますが、この時期を過ぎると徐々に白く柔らかな線となっていく目立ちにくくなります。

【脂肪塞栓、血栓(エコノミー症候群)】

極稀に注入した脂肪や採取の際の脂肪が血管を圧迫し、血流が詰まってしまうことがあります。万が一発生した場合は、適切な処置を行います。

【しこり】

術後、注入部位がしこりのようになり硬さが気になる場合があります。経過には個人差があり、自然に軽快していく場合もありますが、残存してしまうこともあります。

【凹凸】

術後、凹凸が生じる場合があります。通常は時間経過により改善が見られます。術後、半年間は経過観察を行うためなるべく注入部位を刺激しないようにしてください。

【吸引部の拘縮】

吸引部は1か月目で硬くなりますが、徐々に柔らかくなります。

脂肪注入をお受けいただけない方

妊娠中の方、または妊娠をご検討されている方、(胸への脂肪注入の場合、授乳中の方)麻酔剤アレルギーの方、皮膚炎のある方、体調が優れない方やその他の理由によって医師が不可と判断した場合は、脂肪の施術はお受けいただけません。