

## オビソート(アセチルコリン塩化物)注射とは

ボトックスの効果が必要以上に現れてしまった場合に、表情筋の動きを回復させるオビソート(アセチルコリン塩化物)注射を患部に注射して、ボトックスの作用を弱め、回復を早めることができます。

注射1回の効果の持続期間は通常3~4日間程度です。効果の持続期間には個人差があります。症状の改善度に応じて治療効果を維持するために、1~2週間毎に2~3回程度追加処置を受けていただく場合もあります。

## オビソート(アセチルコリン塩化物)注射説明書注射後の状態・ケアについて

- ・メイクは直後から可能ですが、周辺を刺激すると痛む可能性もありますので、強く押ししたり擦ったりせず優しく触るようにしてください。
- ・念のため、注入部位のマッサージは1週間程度行わないでください。
- ・注入当日は安静に過ごし、入浴は避けてぬるま湯で軽いシャワーを浴びる程度にしてください。翌日からは入浴いただけますが、血流が良くなることで血流が良くなり腫れる可能性がありますので、熱いお風呂やサウナ、岩盤浴は避けていただくことをおすすめします。
- ・飲酒は3日程度お控えください。
- ・軽い運動は1週間、激しいスポーツは3週間程度お控えください。

※経過観察をする目的で施術部位の写真を撮らせていただきます

## オビソート(アセチルコリン塩化物)注射で生じる可能性のあるリスクについて

### 【腫れ、内出血】

腫れや内出血が生じる場合があります。数日で収まる場合がほとんどです。

### 【赤み、熱感】

熱感・赤みが続いたり、違和感がある際はクリニックまでご相談ください。

### 【アレルギー】

注入後は稀に蕁麻疹様のアレルギー症状が出る場合があります。

### 【感染】

感染が生じることがあります。抗生剤の内服や外科的処置が必要となる可能性があります。

## オビソート(アセチルコリン塩化物)注射説をお受けいただけない方

妊娠中の方、または妊娠をご検討されている方、授乳中の方、気管支喘息、甲状腺機能亢進症、てんかん、消化性潰瘍、重篤な心疾患のある方、前立腺肥大や尿閉のある方、アレルギーをお持ちの方、皮膚炎のある方、体調が優れない方やその他の理由によって医師が不可と判断した場合は、お受けいただけません。