

## ダーマペン治療とは

ダーマペンは、にきび跡、毛穴のたるみ・開き、小じわなどに対する治療です。皮膚に表面麻酔を行い、極細針で皮膚の真皮層まで微細な穴を開けることで、皮膚の修復機能が高まり、コラーゲンやエラスチンなどの増生が促され、肌質を改善させます。

1. 麻酔クリームを塗布し、約15分間お待ちいただきます。麻酔薬を拭き取り、洗顔後、美容液を導入しながら、ダーマペンで施術を行います。施術時間は約1時間ほどです。

2. 施術中は出血、疼痛、赤みがございます。

3. ひりひり感は直後から数時間、赤みは数日続き徐々に軽快いたします。深く施術を行ったところは内出血の可能性もあります。（肌質や施術の深さにより個人差があります）

4. 施術後に色素沈着をしたり、肝斑が悪化したりする可能性がございます。

5. 洗顔、保湿、日焼け止めは12時間以降から、お化粧品は24時間以降から可能です。

6. 当日、激しい運動、飲酒、サウナ、入浴など血液循環の良くなることはお避け下さい。

7. 治療後は肌の乾燥・日焼けにご注意ください。

8. 2週間以降であれば、ピーリングなど他の施術は可能です。

9. 経過観察をする目的で施術部位の写真を撮らせていただきます。撮影させていただいた写真に関しては、厳重に保管し、患者様との経過観察以外で無断使用することはありませんのでご安心ください。

10. 治療後の皮膚の回復を助けるためにSRSパック（成長因子パック）のご使用をお勧めします

※3~4週間毎、6~12回程度をおすすめします。

<下記の方は治療を受けることができません>

- ・妊娠中・麻酔薬のアレルギーのある方
- ・アトピー性皮膚炎や湿疹、かぶれのため、赤み、痒みが強い場所
- ・赤く膿んだにきびができている場所（赤みが引いたら治療可）
- ・ケロイド体質・出血傾向で毛細血管が目立つ場所
- ・肝斑や日焼け後の色素沈着が強い場所

★トレチノイン使用されている方は前後2週間、レチノールを使用されている方は前後1週間、過酸化ベンゾイルを使用されている方は前後3日、使用をお控え下さい。

★授乳中の方は、術後48時間は断乳して頂きますようお願い致します。

★止血機能障害のある方、抗凝固剤内服中の方、ケロイド体質の方は医師の判断が必要になります。以上は一般的な留意事項であり、症状等には個人差が生じる旨、ご理解いただきますようお願い致します。