

## トライフィルとは

トライフィルとは韓国MCURE（エムキュア）社が開発したサブシジョンと薬液の充填が同時に行える機械です。

皮膚の下にあるニキビ跡で固くなってしまった組織をCO2ガスを注入することで剥離し、皮膚の陥没した部分を上に持ち上げます。同時に非架橋のヒアルロン酸など充填剤を注入することで瘢痕部位の再癒着を軽減。治療効果をさらに高めることが出来ます。組織の癒着をはがし、コラーゲン生成を促すのでしわ改善、ニキビ跡クレーター、毛穴の開き改善効果も期待できます。

### 〈施術後の経過、注意事項〉

1. 洗顔後、ブロック麻酔、局所麻酔を行い、施術を行っていきます。
2. 下記の副作用がありますが、徐々に改善します。
  - ・腫脹（炭酸ガスによる一時的な腫れが当日あり。剥離による腫れは2、3日で徐々に改善します。）
  - ・皮下気腫（炭酸ガスの影響で皮膚を触るとプチプチした感覚があります。1日ほどで改善します。）
  - ・発赤（皮膚の剥離と炭酸ガスの影響により血液循環が良くなるため。通常2～3時間で改善します。）
  - ・内出血（1～2週間）
  - ・針跡（数日で無くなります）
3. 症状により複数回の治療が必要となります。
4. 効果の実感は個人差があります。
5. 施術中に赤みや痛みなどが強くでた場合には、途中で施術を中止する場合があります。
6. 当日洗顔、保湿は12時間お控えください、日焼け止めは12時間以降から可能です。お化粧品は24時間控えてください。
7. 当日、激しい運動、飲酒、サウナ、入浴など血液循環の良くなることはお避け下さい。
8. 治療後は肌の乾燥・日焼けにご注意ください。
9. 2週間以降であれば、ピーリングなど他の施術は可能です。
10. 経過観察をする目的で施術部位の写真を撮らせていただきます。撮影させていただいた写真に関しては、厳重に保管し患者様との経過観察以外で無断使用することはありませんのでご安心ください。

<下記の方は治療をお受けすることができません>

- ・大きな黒子、瞼の上、傷のある部位、傷のある部位
- ・妊娠中、重度の敏感肌、強い炎症（アトピーやかぶれなど）、脂漏性皮膚炎の部位、ヘルペス治療中

★トレチノイン使用されている方は前後2週間、レチノールを使用されている方は前後1週間、過酸化ベンゾイルを使用されている方は前後3日、使用をお控え下さい。

★授乳中の方は、術後48時間は断乳して頂きますようお願い致します。

★止血機能障害のある方、抗凝固剤内服中の方、ケロイド体質の方は医師の判断が必要になります。ヒアルロン酸、ボトックス等、その他美容治療（レーザー含む）の経験、外科的手術、医療機関での治療歴、治療予定のある方は必ずご申告ください。

自己申告のない方は当院での治療に伴う一切の責任を負いかねます。

以上は一般的な留意事項であり、症状等は個人差が生じる旨、ご理解いただけますようお願いいたします。