

トラネックスレチピールとは

この治療は表皮の再生を促す治療であり、主に以下のような効果が期待されます。

①コラーゲン産生によるアンチエイジング：レチノイドがコラーゲン産生を活性化させ、線維芽細胞の増殖を促進

②皮脂コントロール：毛包、皮脂腺に浸透し皮脂をコントロール・抑制

③しみの改善：トラネキサム酸によるメラニンの生成抑制や色素沈着の予防効果

1. ご洗顔後、1液→2液の順に塗布し、6時間後にご自身で洗顔をしていただきます。（2回目以降8時間）

2. 日常的に日焼けに注意し、日焼止めを常時使用してください。

3. 施術前後1週間はピーリング剤やレチノイン酸、ディフェリンゲルなどの使用は控えてください。

4. 4週間の間隔で、4-6回の施術を推奨致します。

5. 治療中多少ピリピリとした痛みを感じることがあります。

6. 一時的に肌が赤くなることがありますが、通常は数時間から数日でおさまります。赤味が長引いたり、皮膚がはがれてかさぶたになったりかぶれが生じた場合には必ず医師にご相談ください。

7. 治療期間中は肌の乾燥を生じたり、皮がむけてくることがあるので保湿を行ってください。

8. 肌のターンオーバーが亢進することで一時的ににきびが悪化することがあります。

9. 経過観察をする目的で施術部位の写真を撮らせていただきます。撮影させていただいた写真に関しては、厳重に保管し患者様との経過観察以外で無断使用することはありませんのでご安心ください。

<下記の方は治療を受けることができません>

- ・2週間以内にピーリングの施術をしている方
- ・施術部位に重篤な皮膚疾患および感染症がある方
- ・出血性疾患を発症している方
- ・糖尿病の方
- ・ヘルペスウイルスの方
- ・妊娠中の方

★トレチノイン使用されている方は前後2週間、レチノールを使用されている方は前後1週間、過酸化ベンゾイルを使用されている方は前後3日、使用をお控え下さい。

★授乳中の方は、術後48時間は断乳して頂きますようお願い致します。

以上は一般的な留意事項であり、症状等は個人差が生じる旨、ご理解いただけますようお願いいたします。