

☑️ トラネキサム酸 500mg



朝・夕後
1回1錠2回

シミ・肝斑の治療に広く用いられている治療薬です。メラニン発生の原因のひとつと考えられるプラスミンをブロックすることで、肝斑の原因となるメラニンの発生を抑制します。

※副作用 かゆみ、発疹、食欲不振、胸やけ、下痢などが報告されています。このような症状がありましたら服用を中止し、担当の医師に相談して下さい。

※服用できない方

- ・血栓症（脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎、肺血栓）の方、また恐れのある方
- ・ピルを服用している方
- ・妊娠中、または妊娠の可能性の高い方
- ・腎不全

☐ ユベラ50mg



毎食後 1回1錠

血管内での血液凝固を防ぎ、体内の血流を改善することで、皮膚の新陳代謝を促進し、色素沈着やシミ、そばかすを改善します。また、酸化によるダメージから細胞を守る働きがあります。

※副作用

便秘、胃部不快感、下痢、過敏症、発疹などが報告されています。このような症状がありましたら服用を中止し、担当の医師に相談して下さい。

☑️ 高濃度ビタミンC 3,000mg



※お召し上がり方

食品として1日あたり1包を目安に、お飲み物に混ぜてお召し上がりください。粉末をそのまま口に入れると、むせる場合もありますのでご注意ください。

高濃度にビタミンCを配合した健康補助食品です。高品質のイギリス産ビタミンCを使用し、持ち運びにも便利なスティックタイプです。ビタミンCはシミの原因となるメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐとともに美しい肌に欠かせないコラーゲンの生成を促進します。

☐ ハイチオール



毎食後 1回1錠

アミノ酸の一種で、メラニンの生成を抑える働きと、肌の新陳代謝を促進してメラニンを体外へ排出する働きがあります。

※副作用

吐き気、下痢、腹痛などが報告されています。

このような症状がありましたら服用を中止し、担当の医師に相談して下さい。

☐ ビタノイリンCP25mg



毎食後 1回1錠

B1、B2、B6、B12を含んでいます。細胞の再生に必要な拡散合成に必須のビタミン剤です。その他、炭水化物や脂質を体内で有効に利用し、蛋白質やコラーゲンなどの生成に必要なアミノ酸合成を助けます。様々な代謝を改善し、湿疹、口内炎、脂漏性皮膚炎、ニキビなどを治療・予防し、皮膚を健康に保ちます。

※副作用

吐き気、下痢、腹痛などが報告されています。

このような症状がありましたら服用を中止し、担当の医師に相談して下さい。

☐ ビオチン0.2%



毎食後 1回1包

ビタミンB群、Hとも呼ばれ、皮膚や髪の毛、爪の健康維持に効果があります。また、皮膚のかゆみの原因となるヒスタミンの生成を抑える働きもあります。